

東京湾における海域モニタリング結果(海底土)
Readings of Sea Area Monitoring of sediment at Tokyo Bay

試料採取日:令和4年10月19日、20日、21日
(Sampling Date: Oct 19, 20, 21, 2022)

令和4年12月13日
Dec 13, 2022
原子力規制委員会
Nuclear Regulation Authority (NRA)

海底土の放射性物質濃度

Radioactivity concentration in marine sediment

採取場所 ^{※1} Sampling Point ^{※1}	採取日 Sampling Date	採取深度 Sampling Depth (m)	海底土の 分類 ^{※2} Sediment Classification ^{※2}	放射性物質濃度 (Bq / kg・乾土) Radioactivity Concentration (Bq / kg・dry soil)	
				Cs-134	Cs-137
【K-T1】	2022/10/21	13.1	M	0.74	30
【K-T2】	2022/10/21	24.9	M	< 0.41	17
【M-C1】	2022/10/19	8.0	M w/ S	0.40	8.7
【M-C2】	2022/10/19	11.8	M	0.51	15
【M-C3】	2022/10/19	11.2	M	< 0.39	6.9
【M-C4】	2022/10/19	16.0	M	< 0.38	18
【M-C5】	2022/10/21	18.1	M	0.55	22
【M-C6】	2022/10/21	18.5	M	0.60	19
【M-C7】	2022/10/19	17.2	M	0.40	12
【M-C8】	2022/10/19	18.0	M	< 0.35	13
【M-C9】	2022/10/20	20.2	M	< 0.40	9.6
【M-C10】	2022/10/20	6.5	S	< 0.33	1.8
【C-P1】	2022/10/20	20.6	M	< 0.42	6.0
【C-P2】	2022/10/20	14.2	M w/ S	< 0.35	3.6
【C-P3】	2022/10/20	14.8	M	0.54	23
【C-P4】	2022/10/20	13.6	M	0.62	18
【C-P5】	2022/10/20	8.6	S	< 0.33	0.57
【C-P8】	2022/10/20	6.4	M	1.4	56

※1 【 】内の番号は、図の測点番号に対応。

※1 The character enclosed in parentheses indicates Sampling Point in figure.

※2 S : 中細砂 Medium / fine sand

M w/ S : 中細砂混じり泥 Mud with medium / fine sand

M : 泥 Mud

*原子力規制委員会の依頼により、(公財)海洋生物環境研究所が採取した試料を(株)KANSOテクノスが分析。

* KANSO Co.,Ltd analyzed the samples collected by

Marine Ecology Research Institute (MERI) received the request of Nuclear Regulation Authority (NRA).

*「< XX」は、放射性物質濃度が検出下限値(XX)未満であることを表す。

* "< XX" means that radioactivity concentration is lower than the detection limit XX.

* 測定点の緯度経度は下記 URL を参照。

* Refer to the URL below for the latitude and longitude of the sampling points.

* <https://radioactivity.nsr.go.jp/ja/contents/17000/16507/view.html>

(参考)

海上保安庁が公表した「放射能調査報告書」－平成21年及び22年調査結果－によると、東京湾内の地点【K-T1】において平成21年、平成22年に採取した海底土中のCs-137濃度は、それぞれ4.0Bq/kg・乾土、3.5 Bq/kg・乾土。

(Reference)

Reports of radioactivity surveys which were published by Japan Coast Guard in 2009 and 2010 show that the concentrations of Cs-137 in the marine soil sampled at 【K-T1】 in 2009 and 2010 were 4.0 Bq/kg・dry soil and 3.5 Bq/kg・dry soil, respectively.

東京湾における海底土採取場所
Marine sediment sampling points at Tokyo Bay

