

東京湾における海域モニタリング結果(海底土)
Readings of Sea Area Monitoring of sediment at Tokyo Bay

試料採取日: 令和3年8月17日、19日、20日
(Sampling Date: Aug 17, 19, 20, 2021)

令和3年10月26日

Oct 26, 2021

原子力規制委員会
Nuclear Regulation Authority (NRA)

海底土の放射性物質濃度
Radioactivity concentration in marine sediment

測定試料採取点 ^{※1} Sampling Point ^{※1}	採取日 Sampling Date	海底土の 分類 ^{※2} Sediment Classification ^{※2}	放射性物質濃度(検出下限値)(Bq/kg・乾土)(ND ^{※3} :不検出) Radioactivity Concentration (Lower detection limit) (Bq / kg・dry soil) (ND ^{※3} : Not Detectable)	
			Cs-134	Cs-137
【K-T1】	2021/8/20	M	1.1	35
【K-T2】	2021/8/20	M	0.90	19
【E-T2】	2021/8/20	M w/ S	1.1	34
【M-C1】	2021/8/20	S w/ M	0.64	16
【M-C2】	2021/8/19	M	0.82	16
【M-C3】	2021/8/19	M w/ S	0.29	5.3
【M-C4】	2021/8/19	M	0.68	16
【M-C5】	2021/8/20	M	0.61	22
【M-C6】	2021/8/19	M	0.72	18
【M-C7】	2021/8/19	M	0.49	14
【M-C8】	2021/8/19	M	ND(0.35)	13
【M-C9】	2021/8/17	M	ND(0.38)	9.9
【M-C10】	2021/8/17	M w/ S	ND(0.36)	4.3
【C-P1】	2021/8/17	M	ND(0.33)	6.2
【C-P2】	2021/8/17	M w/ S	ND(0.32)	3.9
【C-P3】	2021/8/17	M	0.68	18
【C-P4】	2021/8/17	M	0.72	19
【C-P5】	2021/8/17	S w/ M	ND(0.35)	0.82
【C-P8】	2021/8/17	M	2.6	64

※1 【 】内の番号は、図の測点番号に対応。

※1 The character enclosed in parentheses indicates Sampling Point in figure.

※2 S w/ M : 泥混じり中細砂 Medium /fine sand with mud

M w/ S : 中細砂混じり泥 Mud with medium /fine sand

M : 泥 Mud

※3 NDの記載は、海底土の放射性物質濃度の検出値が検出下限値を下回る場合。

※3 ND indicates the case that the detected radioactivity concentration in marine soil was lower than the detection limits.

*原子力規制委員会の依頼により、(公財)海洋生物環境研究所が採取した試料を(株)KANSOテクノスが分析。

* KANSO Co.,Ltd analyzed the samples collected by

Marine Ecology Research Institute (MERI) received the request of Nuclear Regulation Authority (NRA).

(参考)


海上保安庁が公表した「放射能調査報告書」-平成21年及び22年調査結果-によると、東京湾内の地点【K-T1】において平成21年、平成22年に採取した海底土中のCs-137濃度は、それぞれ4.0Bq/kg・乾土、3.5 Bq/kg・乾土。

(Reference)

Reports of radioactivity surveys which were published by Japan Coast Guard in 2009 and 2010 show that the concentrations of Cs-137 in the marine soil sampled at 【K-T1】 in 2009 and 2010 were 4.0 Bq/kg・dry soil and 3.5 Bq/kg・dry soil, respectively.

東京湾における海底土採取ポイント

Marine sediment sampling points at Tokyo Bay



(参考)

海上保安庁が公表した「放射能調査報告書」-平成21年及び22年調査結果-によると、東京湾内の地点【K-T1】において平成21年、平成22年に採取した海底土中のCs-137濃度は、それぞれ4.0Bq/kg・乾土、3.5 Bq/kg・乾土。

(Reference)

Reports of radioactivity surveys which were published by Japan Coast Guard in 2009 and 2010 show that the concentrations of Cs-137 in the marine soil sampled at 【K-T1】 in 2009 and 2010 were 4.0 Bq/kg·dry soil and 3.5 Bq/kg·dry soil, respectively.